canton de vaud
LIBERTÉ ET PATRIE

Service de la santé publique

Rue Cité - Devant 11
1014 Lausanne

Algorithme 2

Douleurs thoraciques (syndrome coronarien aigu)

Bilan primaire

O_2 si Sp O_2< 94%

Monitorage cardiaque - TA – VVP – SpO2

ACIDE ACETYLSALICYLIQUE 500 mg per os (évent iv)

Si TAS ≥ 90 mmHg
NITROGLYCERINE 0,8 mg (= 1 cp sublingual)
OU
DINITRATE D'ISOSORBIDE 2,5 mg (= 2 bouffées)

Contre-indication absolue
=
VIAGRA – LEVITRA ds les 24 heures
CIALIS ds les 48h

SI MEDICALISATION INDISPONIBLE
TRANSPORT SANS DELAI

Douleurs persistantes après 3 minutes

Si TAS ≥ 90 mmHg
NITROGLYCERINE 0,8 mg (= 1 cp sublingual)
OU
DINITRATE D'ISOSORBIDE 2,5 mg (= 2 bouffées)

Contre-indication absolue
=
VIAGRA – LEVITRA ds les 24 heures
CIALIS ds les 48h

Si douleurs ≥ 3 après 3 minutes

TAS ≥ 90 mmHg
FC > 60/min.
FR ≥ 16/min.
GCS 15

Morphine ivl 2 mg à répéter 1x si douleurs ≥ 3 après 3 minutes

Validé par la CMSU le 08 mars 2011